
	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN"</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>




**REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD  
"INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN"**  
**IAWS**

**ANEXO 5 AL REGLAMENTO TECNICO  
VALORACION DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES  
GANADERAS DE PORCINO**

	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD</b> <b>“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>


<b>INDICADOR</b>	<b>5.1.1.1 MALA CONDICION CORPORAL</b>	
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales con signos evidentes de problemas nutricionales,patologicos o de manejo que presentan signos evidentes de desnutrición.	
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la condición corporal adecuada de los animales. Se tendrá en consideración la existencia de animales delgados, en los que se evidencien a través de la piel los huesos de la columna, de las paletas y de las caderas. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes.	
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 2% de los animales evaluados	
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>		

<b>INDICADOR</b>	<b>5.2.8 SUCIEDAD &gt;50% DEL CUERPO</b>	
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales que presentan suciedad en mas del 50% de su cuerpo.	
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente las regiones del cuerpo del animal con suciedad. Se dividirá el animal en tres regiones en función de la superficie corporal que abarcan, craneal (25%) media (50%) y caudal(25%), se estimará la cantidad de superficie cubierta de suciedad sobre cada región y se sumará la totalidad de la superficie cubierta de las tres regiones.	
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	100% de los animales observados con deficiencias. (se deberá revisar la instalación en el caso de observar al 100% de los animales de una cuadra o corral con >50% del cuerpo con suciedad)	
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>		


	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD</b> <b>“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>


<b>INDICADOR</b>	<b>5.3.5.11 DIFICULTAD RESPIRATORIA</b>
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales con signos evidentes de dificultad a la hora de respirar.
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de animales con disneas, pandeo abdominal acelerado, toses graves y posturas de perro sentado. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 20% de los animales evaluados
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	



<b>INDICADOR</b>	<b>5.4.1.1 /5.4.1.2 HERIDAS ABIERTAS/ULCERAS EN ESPALDA, LOMO O COCCIX</b>
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales con heridas abiertas o úlceras en espalda,lomo o coccix.
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de heridas abiertas o úlceras sin tratamiento, especialmente en las areas expuestas a rozaduras o lesiones ( lomo, espalda y coccix).
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	

	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD</b> <b>“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>


INDICADOR	5.4.1.1 METRITIS
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales con signos evidentes de infección purulenta del aparato genital .
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de la vulva congestionada junto con la aparición de descargas vaginales purulentas.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	

INDICADOR	5.4.1.1 MASTITIS
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales con signos evidentes de infección/ inflamación de las glándulas mamarias .
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la aparición de mamas inflamadas, enrojecidas o tumefactas.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	

	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD</b> <b>“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>

INDICADOR	5.4.1.1 / 5.4.1.2 PROLAPSO RECTAL O UTERINO
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales en los cuales la ultima porción del útero o del recto queda expuesta al exterior, por un problema mecanico o patológico.
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de prolapso de utero o recto de mas de 20 cm, con o sin hemorragias o necrosados.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	 


INDICADOR	5.4.1.1 / 5.4.1.2 HERNIAS
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales con protusiones de organos fuera de la cavidad que ocupan habitualmente en el cuerpo. Diferenciamos hernias umbilicales( area del ombligo), inguinales( area de la ingle) o escrotales( escroto).
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de hernias de mas de 20cm, que impidan la movilidad adecuada del animal o supongan un riesgo de lesión para el mismo. Del mismo se valorar la exitencia de heridas abiertas y/o abrasiones.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	 

	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD</b> <b>“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>

<b>INDICADOR</b>	<b>5.4.1.1 / 5.4.1.2 ABSCESOS</b>
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales con acumulaciones de pus visibles externamente en cualquier región corporal.
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de abscesos a lo largo de la anatomía del animal.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	 


<b>INDICADOR</b>	<b>5.4.1.1 / 5.4.1.2 COJERAS</b>
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORAS.ENGORDE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Apoyo anormal o insuficiente de una extremidad. Animales con signos evidentes de dificultad a la hora de apoyar alguna extremidad, manteniendo la misma levantada totalmente o levantandola parcialmente al contactar con el suelo .
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de falta de apoyo en alguna de las extremidades, siempre con el animal en movimiento
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	 



	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD</b> <b>“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>

INDICADOR	5.4.1.2 MORDEDURAS DE COLA
<b>RANGO</b>	ENGORDE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales que presentan lesiones o amputaciones de la cola a consecuencia de mordeduras
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de heridas abiertas o necroticas en la cola, así como la falta de la misma a consecuencia de las lesiones. La valoración se obtendrá de la suma de las lesiones de Nivel 1 y Nivel 2.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.2
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>NIVEL 1</span> <span>NIVEL 2</span> </div>

INDICADOR	5.4.1.1 HERIDAS EN APARATO REPRODUCTOR EXTERNO
<b>RANGO</b>	REPRODUCTORES
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales que presentan lesiones o amputaciones en el aparato reproductor externo ( vulva, mamas, escroto, prepucio)
<b>METODOLOGIA</b>	Se valora visualmente la existencia de heridas abiertas o necroticas en el aparato reproductor externo.
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>	

	<b>REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD</b> <b>“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”</b> <b>IAWS</b>	
	<b>GANADO PORCINO</b>	<b>12.02.2019</b>

INDICADOR		5.6.2.9 MAL CORTE DE COLAS	
<b>RANGO</b>		Lechones	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Animales que presentan corte de colas inadecuados en cuanto a su deficiente longitud o por mala cicatrización.		
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Se valora visualmente la longitud de cola residual. Esta debe como mínimo cubrir la vulva en el caso de las hembras y el esfínter anal en los machos, si bien la longitud de los rabos de los animales del mismo corral debiera ser similar.</p> <p>Del mismo modo se observará la correcta cicatrización de los mismos, no existiendo heridas ni sangrados.</p>		
<b>NIVEL MAXIMO PERMITIDO</b>	< 5% de los animales evaluados		
<b>IMAGEN DIAGNOSTICA</b>			